

# ENQUÊTE NATIONALE PÉRINATALE 2016

## PREMIERS RÉSULTATS

Les enquêtes nationales périnatales (ENP) sont réalisées à intervalle régulier pour disposer d'informations détaillées sur la grossesse, l'accouchement et la santé à la naissance.

L'ENP 2016 porte sur un échantillon représentatif de 14 142 naissances survenues entre le 14 et le 20 mars 2016, dans les 517 maternités de France.

Les données proviennent des dossiers médicaux, d'un entretien auprès des

femmes et d'un questionnaire décrivant les maternités.

L'étude a été réalisée par l'Équipe EPOPé de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), en collaboration avec la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) et Santé publique France.

**L'ensemble des partenaires remercie les services départementaux de Protection maternelle et infantile, les réseaux de santé en périnatalité, les professionnels des maternités et les enquêteurs qui ont permis la réalisation de cette étude.**



**Direction générale  
de la santé**

**Direction générale  
de l'offre de soins**




## Les facteurs de risque pendant la grossesse

### DES ÉVOLUTIONS DÉFAVORABLES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


● Métropole 2010

● Métropole 2016



### LA SITUATION DANS LES DROM EN 2016

● DROM 2016



Les caractéristiques socio-économiques des femmes dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont plus défavorables qu'en France métropolitaine. En 2016, **5 %** des femmes enceintes en France métropolitaine déclarent ne pas vivre en couple, **25 %** dans les DROM.

## Suivi des femmes enceintes et prévention

(en France métropolitaine)

**23 %** ont pris de l'acide folique avant la grossesse

**29 %** ont eu un entretien prénatal précoce

**65 %** ont consulté une sage-femme

**78 %** des primipares ont suivi une préparation à la naissance et à la parentalité

**36 %** ont eu au moins 6 échographies


**7 %** ont été vaccinées contre la grippe saisonnière



## Des accouchements dans des maternités plus grandes et plus spécialisées



● Métropole 2010 ● Métropole 2016




**7 %** des femmes rapportent un temps de **trajet de 45 min** ou plus pour venir accoucher à la maternité, en 2016 comme en 2010.

## Moins d'interventions lors de l'accouchement



● Métropole 2010 ● Métropole 2016



En 2016, dans les DROM, la fréquence de ces interventions est similaire.

## Une prise en charge de la douleur en phase avec les attentes des femmes




En France métropolitaine, avant leur accouchement, **64 %** des femmes souhaitent absolument une analgésie péridurale et **21 %** des femmes l'envisageaient.

**82 %** des femmes qui ont accouché par voie basse ont bénéficié d'une analgésie péridurale. Parmi elles, **54 %** ont pu utiliser une PCEA\* pour gérer elles-mêmes la douleur.

\*analgésie péridurale auto-contrôlée par la patiente


## Augmentation continue de la prématurité

(nés vivants avant 37 semaines d'aménorrhée)



En 2016, **11,7 %** des enfants (uniques ou multiples) sont nés prématurément dans les DROM.

## Diminution de l'allaitement maternel à la maternité depuis 2010



En France métropolitaine, l'allaitement exclusif a fortement diminué alors qu'une augmentation avait été observée en 1995 et 2010, après la mise en place d'une politique active en faveur de l'allaitement. En 2016, **83,3 %** des femmes allaitaient dans les DROM.

Pour en savoir plus