

Les pathologies bucco-dentaires pendant la grossesse

Les maladies carieuses et parodontales sont provoquées par un déséquilibre de la flore bactérienne buccale qui dépasse les capacités de défense de la salive et des tissus oraux.

LES PATHOLOGIES DENTAIRES : CARIE ET ÉROSION

La maladie carieuse

La carie devient douloureuse avec le temps. C'est un processus lent (environ 2 ans), la grossesse n'est donc pas responsable de l'apparition de carie, mais seulement de son évolution. Une carie débutante peut être reminéralisée.

Maladie carieuse

L'érosion dentaire

Contrairement à la carie d'évolution lente, l'érosion dentaire peut se produire en quelques mois et est irrémédiable.

Elle est liée à l'acidité de la cavité buccale (modification salivaire, reflux gastrique).

Érosion dentaire

LES PATHOLOGIES PARODONTALES : GINGIVITES ET PARODONTITES

La gingivite

Très répandue, la gingivite est une réaction inflammatoire réversible de la gencive face à l'accumulation bactérienne sur les surfaces dentaires : œdème, rougeur, saignements, sensibilité.

L'imprégnation hormonale de la gencive favorise le développement de gingivite dès le 2^{ème}-3^{ème} mois.

Durant la grossesse, l'efficacité réduite des défenses immunitaires peut favoriser le passage d'une gingivite à une atteinte plus profonde, la parodontite.

Gingivite

Parodontite

La parodontite

Plus rare chez le sujet jeune, la parodontite atteint l'os de soutien des dents de façon irréversible, et peut se manifester par des déplacements dentaires, des abcès et la perte de dents.

La pénétration dans la circulation sanguine de bactéries et de médiateurs inflammatoires des parodontites peut induire des complications de la grossesse (pré-éclampsie, retard de croissance in utero, accouchement prématuré). La parodontite est donc un facteur de risque.

Tout saignement gingival doit être un signe d'alerte !

À RETENIR SUR LES FACTEURS DE RISQUE PENDANT LA GROSSESSE :

- La maladie carieuse est un processus lent, l'érosion dentaire un processus rapide.
- La gingivite concerne 2 grossesses sur 3. Elle complique les mesures d'hygiène bucco-dentaire.
- La parodontite dans sa forme la plus sévère (10 % des sujets) est un facteur de risque parmi d'autres de complications de la grossesse.